

Über Immunisierungs-
versuche mit Schutz-
pockenlymphe an
Kaninchen.

Heinrich Amelung.



Aus der bayer. Landesimpfanstalt in München.

Leiter: Landesimpfarzt Privatdozent Dr. A. Groth.

Über Immunisierungs- versuche mit Schutzpocken- lymphe an Kaninchen.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der Würde eines doctor medicinæ veterinariæ

vorgelegt der

der hohen tierärztlichen Fakultät der
Universität München

vom Tierarzt

Heinrich Amelung aus Bockenem.



Gedruckt mit Genehmigung der tierärztlichen
Fakultät der Universität München.

Der Dekan
Prof. Dr. Schmitt.

Referent: Prof. Dr. Süpfle.

Zur Immunisierung menschlicher oder tierischer Organismen werden entweder Impfstoffe, welche die Krankheitserreger in vollviulenter bezw. mitigierter Form enthalten, oder solche aus abgetöteten Bakterien, deren Extracten Aggressinen und Toxinen verwendet. Als beste Schutzimpfmethode wird diejenige anzusehen sein, welche einfach in ihrer Anwendung ist, dabei mit Sicherheit und unter größtmöglicher Vermeidung einer Gefährdung zur Immunität führt. Ein Haupterfordernis hierfür ist eine genaue Dosierung des Impfstoffes, die unmöglich ist bei lebenden Erregern, da wir deren Wachstumsverhältnisse in den zu immunisierenden Organismen nicht genügend beherrschen. Eine einigermaßen genaue Dosierung läßt sich nur durchführen bei abgetöteten Kulturen oder Bakterienextrakten. Danach würde an sich unter der Voraussetzung des gleichen Erfolges eine Impfmethode mit abgetöteten Bakterien oder Extracten diejenige sein, deren Verwendung an aller erster Stelle in Betracht gezogen werden müßte.

Um nun die Möglichkeit einer Immunisierung mit abgetöteten Erregern experimentel zu beleuchten, erschien es von Interesse, Versuche, welche in letzter Zeit durch Tierarzt Lechner in der bayerischen Landesimpfanstalt vorgenommen wurden, noch weiter zu ergänzen. Lechner konnte nachweisen, daß durch eine einmalige

Injektion von abgetöteter Pockenlymphe beim Kaninchen keine Immunität erzielt werden kann. Er benutzte zur Impfung Lymph, die durch einstündiges Erhitzen auf 56° abgetötet war und nahm 4 Versuche mit 0,1, 0,5, 1,0, und 2,0 ccm abgetöteter Lymph vor. Jeder Versuch erstreckte sich über eine Gruppe von 4 Tieren, die auf intrakutanem, subkutanem, intravenösem und intraabdominellen Wege geimpft wurden. Die kutane und intrakutane Reinfektion mit virulenter Lymph ergab bei der Gruppe, die mit 0,1 ccm abgetöteter Lymph vorgeimpft war, daß bei sämtlichen 4 Tieren eine Immunität nicht eingetreten war. Ebenso zeigten sich die Tiere der anderen 3 Gruppen, die mit 0,5, 1,0 und 2,0 ccm abgetöteter Lymph vorbehandelt waren, gegen eine Reinfektion nicht geschützt. Allerdings schienen die intrakutan geimpften Tiere eine etwas stärkere Resistenz gegen die Reinfektion zu besitzen, da diese nicht mehr so starke Pocken erzeugte. Und zwar schien die Resistenz mit steigender Impfdosis zuzunehmen. Der geringe Unterschied in der Wirkung der Impfmethode beruht wohl darauf, daß bei der subkutanen, intravenösen und intraabdominellen Impfung das Virus zu rasch resorbiert oder unschädlich gemacht wird, ehe es an die Epidermis, den Sitz der immunisierenden Zelle gelangt, während bei der intrakutanen Impfung die Lymph direkt mit diesen Zellen in Berührung kommt. Nun ist theoretisch die Möglichkeit denkbar, daß durch mehrere in bestimmten Intervallen aufeinanderfolgende intravenöse und subkutane Impfungen doch genügende Mengen von dem injizierten Virus an die Epidermis gelangen und Immunität auslösen können. Ebenfalls ist es denkbar, daß bei der intrakutanen Impfung mit abgetöteter

Lympe durch verschiedene in bestimmten Zeitabschnitten folgende Injektionen (wie bei der Cholera- und Typhus-schutzimpfung) die erhöhte Resistenz, die Lechner gegen eine Reinfektion mit virulentem Material fand, zur vollständigen Immunität zu verstärken wäre.

Ich habe daher durch Tierversuche festzustellen gesucht, ob durch mehrmalige in bestimmten Intervallen aufeinanderfolgende Impfungen mit abgetöteter Pockenlymphe eine Immunität gegen eine nachfolgende künstliche Reinfektion mit virulenter Pockenlymphe zu erzielen ist. Als Versuchstiere benutzte ich Kaninchen und zwar Albinos, da diese sich nach L. Voig am besten zur Immunisierung mit Pockenlymphe eignen. Zu meinem Versuch benötigte ich 18 Kaninchen, die ich in drei Gruppen zu 6 Tieren einteilte. Gruppe 1 wurde intravenös mit abgetöteter Lymphe geimpft, Gruppe 2 subkutan und Gruppe 3 intrakutan. Von jeder Gruppe wurden 2 Tiere zweimal, zwei weitere dreimal und die letzten beiden 4 mal mit abgetöteter Lymphe in Intervallen von je 5 Tagen geimpft. Die Reinfektion mit virulenter Lymphe habe ich 10 Tage nach der letzten Impfung vorgenommen. Zur besseren Beobachtung der Impfreaktion wurden die Tiere mit Calciumhydrogensulfid enthaart und zwar die Kaninchen von Gruppe 1 und 2 am Tage nach der letzten Impfung mit virulenter Lymphe, um am Tage der Reinfektion eine glatte unverletzte Haut zu haben. Die Kaninchen der Gruppe 3, die schon bei der intrakutanen Impfung mit abgetöteter Lymphe zwecks exakterer Ausführung enthaart sein mußten, wurden auf der rechten Körperseite schon 10 Tage vor der ersten Impfung enthaart, auf der linken erst 10 Tage vor der Reinfektion mit virulenter Lymphe. Die

Impfungen mit abgetötetem Virus wurden bei diesen Tieren auf der rechten, die Reinfektion auf der linken Körperseite vorgenommen. Die Versuchstiere wurden zur besseren Kontrollierung mit Ohrmarken versehen und in Einzelkäfigen untergebracht. Um Fehlerquellen durch interkurrente Erkrankungen nach Möglichkeit auszuschalten, wurden zu den Versuchen nur gesundheitsmäßig einwandfreie Tiere genommen und diese täglich auf ihren Gesundheitszustand durch Temperaturmessungen, Wägungen etc. untersucht. Als Impfstoff benutzte ich Lymphe Nr. 52, die sich bei den Kinderimpfungen in der bayerischen Landesimpfanstalt als sehr virulent erwiesen hatte. Zu 1 ccm dieser Lymphe wurden 9 ccm physiologischer Kochsalzlösung gesetzt, diese Mischung filtriert und das Filtrat in einzelne Reagenzgläschen eine Stunde lang im Wasserbade auf 56° erhitzt und das Virus dadurch schonend abgetötet. Von dieser im Verhältnis von 1:10 verdünnten und abgetöteten Lymphe wurden den Versuchstieren bei jeder Impfung 10 ccm injiziert. Diese Dosis entspricht einer Lymphmenge von 1 ccm, die genügt, um ca. 100 Kinder zu impfen. Bei der intravenösen Impfung wurde der Impfstoff in die Ohrvene injiziert. Bei der subkutanen je eine Hälfte der Impfdosis also 5 ccm an jeder Bauchseite. Zur intrakutanen Impfung wurden 20 Injektionen von je 0,5 ccm in die Haut vorgenommen. Die Reinfektion wurde ebenfalls mit Lymphe Nr. 52 ausgeführt und zwar auf kutanem und intrakutanem Wege. Bei der intrakutanen Reinfektion wurden 0,5 ccm einer filtrierten Verdünnung von 1:10 der virulenten Lymphe mit physiologischer Kochsalzlösung durch 5 Injektionen von je 0,1 ccm appliziert. Zur Vornahme der kutanen Reinfektion wurde

auf einer Fläche von ca. 5 mal 7 ccm die obere Schicht der Epidermis durch Schaben mit dem Rasiermesser entfernt und in diese so aufgeraute Haut 0,25 ccm der unverdünnten virulenten Lymphe mit dem Finger ca. 5 Minuten lang intensiv eingerieben.

Zur besseren Übersicht über die Versuchsanordnung diene folgende Tabelle.

Versuchsanordnung. I. Versuch.

Kanin- chen Nr.	Impfmethode	I. Im- pfung am:	II. Im- pfung am:	III. Im- pfung am:	IV. Im- pfung am:	Reinfektion mit virulente Lymphe am
1	Intravenös	6. 6.	11. 6.	—	—	21. 6.
2	"	6. 6.	11. 6.	—	—	21. 6.
3	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	—	26. 6.
4	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	—	26. 6.
5	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	21. 6.	1. 7.
6	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	21. 6.	1. 7.
7	Subkutan	6. 6.	11. 6.	—	—	21. 6.
8	"	6. 6.	11. 6.	—	—	21. 6.
9	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	—	26. 6.
10	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	—	26. 6.
11	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	21. 6.	1. 7.
12	"	6. 6.	11. 6.	16. 6.	21. 6.	1. 7.
13	Intrakutan	16. 6.	21. 6.	2. 66.	1. 7.	11. 7.
14	"	16. 6.	21. 6.	26. 6.	1. 7.	11. 7.
15	"	21. 6.	26. 6.	1. 7.	—	11. 7.
16	"	21. 6.	26. 6.	1. 7.	—	11. 7.
17	"	21. 6.	26. 6.	—	—	7. 7.
18	"	21. 6.	26. 6.	—	—	7. 7.

Die Ergebnisse des Versuchs gehen aus nachstehenden Protokollen hervor:

Kaninchen Nr. 1, Albino weiblich.

6. 6. Temp. 38,9. Gewicht 1460 gr. Allgemeinbefinden gut.

I. Impfung intravenös r. Ohrvene. 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10)

7. 6. — 10. 6. Temp. 38,6 — 39,1.

11. 6. Temp. 29,1.

II. Impfung intravenös l. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. Temp. 38,6 Seröser Nasenausfluss u. Schnupfen

13. 6. — 20. 6. Temp. 39,8 — 40,9. Krankheitserscheinung verstärkt. Starke Abmagerung.

21. 6. Temp. 39,3 Gewicht 1050 gr. Befinden schlecht.

Reinfektion mit virulenter Lymphe intrakutan 0,5 ccm (1:10) Kután 0,25 ccm unverdünnt.

22. 6. Temp. 38,6. Befinden stark apathisch. Die intrakutanen Impfstellen ohne Befund. Die kutane Impffläche blaurot verfärbt. Verendet am 22. 6. Sektionsbefund: Coccidiofisis.

Kaninchen Nr. 2, Albino weiblich.

6. 6. Temp. 38,8. Gew. 1400 gr. Allgemeinbefinden gut.

I. Impfung intravenös r. Ohrvene. 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6. — 10. 6. Temp. 38,7 — 39,1.

11. 6. Temp. 39,8.

II. Impfung intravenös l. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. — 20. 6. Temp. 38,6 — 39,2.

21. 6. Temp. 39,1.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10) Kután 0,25 ccm unverdünnt.

22. 6. Temp. 39,4. An den 5 intrakutanen Impfstellen je eine ca. kirschgroße leicht erhabene Infiltra-

tion mit erbsengroßem intensiv roten Fleck in der Mitte. Die Impffläche schwach infiltriert, gerötet und z. T. mit Blutkrusten bedeckt.

23. 6. Temp. 39,6. Die Infiltrationen an Umfang abgenommen, aber stärker erhaben, derber und diffus gerötet. Die Impffläche kräftiger infiltriert und gerötet, derb, z. T. mit Blutkrusten bedeckt.

24. 6. Temp. 40,7. Halbkugelig vorspringende, derbe, scharlachrot verfärbte Papeln von 0,8 cm Durchmesser. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet, derb. Sie macht den Eindruck eines Konglomerates von konfluierenden Papeln. Die Blutkrusten lösen sich ab.

25. 6. Temp. 38,8. Die Papeln 0,7 - 0,8 cm groß nicht mehr so intensiv gerötet, mit Schüppchen bedeckt und von derber Konsistenz. Die Impffläche stark infiltriert, gerötet, derb und mit weißlichen Krusten bedeckt. Am Rande viele hirsekorngroße Knötchen.

26. 6. Temp. 38,8. Papeln 0,6 - 0,8 cm groß, stark zurückgegangen, kaum noch vorspringend, schwach gerötet und weich. Die Impffläche nur noch schwach infiltriert, gerötet, z. T. mit weißlichen Krusten bedeckt. Randknötchen wie gestern.

27. 6. Temp. 38,8. 1 Pappel verschwunden, die vier anderen auf 0,5 - 0,7 cm zurückgegangen, leicht erhaben, schwach gerötet und weich. Die Impffläche wie gestern. Die Krusten lösen sich ab. Randknötchen verschwunden.

28. 6. Temp. 38,7. Pappel sehr stark zurückgegangen, kaum noch fühlbar, weich und nicht mehr gerötet. Impffläche nur noch ganz schwach infiltriert und gerötet.

29. 6. Temp. 38,4. Nur noch 1 Pappel ganz schwach fühlbar. Die Impffläche ohne Befund.

30. 6. Temp. 38,8. Leichte Vernarbungen, sonst ohne Befund.

Kanindchen Nr. 3, Albino weiblich.

6. 6. Temp. 38,8. Gewicht 1320 gr. Befinden gut.

I. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1 : 10).

7. 6. – 10. 6. Temp. 38,9 – 39,2.

11. 6. Temp. 38,8.

II. Impfung intravenös l. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1 : 10).

12. 6. – 15. 6. Temp. 38,9 – 39,4.

16. 6. Temp. 39,3.

III. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1 : 10). 15 Minuten nach der Impfung starke Unruheerscheinungen und frequente Atmung. Temp. 39,5. Dauer des Anfalles 25 Minuten.

17. 6. – 25. 6. Temp. 38,9 – 39,4.

26. 6. Temp. 38,9.

Reinfektion mit virulenter Lymphe intrakutan 0,5 ccm (1 : 10) kutan 0,25 ccm unverdünnt.

27. 6. Temp. 39,1. Die 5 intrakutanen Impfstellen 1,8 – 2 cm im Durchmesser infiltriert, leicht erhaben und ganz schwach gerötet. Die Impffläche leicht infiltriert, weich, stark gerötet, z. T. mit Blutkrusten bedeckt.

28. 6. Temp. 39,5. Die Infiltration auf 1 cm Durchmesser zurückgebildet, aber kräftig erhaben, derb und intensiver gerötet. Die Impffläche stark infiltriert, mehr oder weniger derb, intensiv gerötet und zum Teil mit Blutkrusten bedeckt.

29. 6. Temp. 39,8. Befinden leicht getrübt. 0,9 cm große halbkugelig vorspringende derbe und stark gerötete Papeln. Impffläche wie gestern. Am Rande viele hirsekorngroße rote Knötchen.

30. 6. Temp. 40,3. Befinden betrübt. Sonstiger Befund wie gestern.

1. 7. Temp. 38,9. Papeln im Zurückbilden, 0,8 bis 0,9 cm groß, ziemlich stark vorspringend, derb, gerötet, ohne scharfe Begrenzung und mit Schüppchen bedeckt. Die kutane Impffläche stark infiltriert, derb und gerötet, z. T. mit weißlichen Krusten bedeckt. Die Randknötchen bilden sich zurück.

2. 7. Temp. 39,0. Papeln auf 0,6 - 0,7 cm zurückgegangen, nur noch leicht erhaben und schwach gerötet. Die Impffläche schwach infiltriert und sonstiger Befund wie gestern.

3. 7. Temp. 38,8. Papeln kaum noch linsengroß leicht erhaben, weich und schwach gerötet. Die Impffläche ganz leicht infiltriert und gerötet, z. T. mit Krusten bedeckt. Randknötchen verschwunden.

4. 7. Temp. 38,8. Papeln kaum noch fühlbar. Die Impffläche noch mehr zurückgegangen.

5. 7. Temp. 38,7. 3 Papeln verschwunden, die übrigen zwei kaum fühlbar. Die Impffläche leicht verkruftet, sonst ohne Befund.

Kaninchen Nr. 4, Albino weiblich.

6. 6. Temp. 38,8. Gewicht 1250 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6. - 10. 6. Temp. 38,5 - 38,7.

11. 6. Temp. 38,7.

II. Impfung intravenös l. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. - 15. 6. Temp. 38,8 - 39,0.

16. 6. Temp. 39,5.

III. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10). Gleich nach der Impfung tritt starke Dyspnoe ein. Das Tier verendet nach 5 Minuten.

Sektion ohne Befund. Todesursache: Anaphylaxie.

Kaninchen Nr. 5, Albino männlich.

6. 6. Temp. 39,0. Gewicht 1390 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6. – 10. 6. Temp. 38,7 – 39,1.

11. 6. Temp. 38,7.

II. Impfung intravenös l. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. – 15. 6. Temp. 38,6 – 38,9.

16. 6. Temp. 38,9.

III. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10). 15 Minuten nach der Impfung Unruheerscheinungen und frequente Atmung. Dauer des Anfalles ca. 25 Minuten.

17. 6. – 20. 6. Temp. 38,7 – 38,9.

21. 6. Temp. 39,0.

IV. Impfung intravenös l. Ohrvene. Mittags 12 Uhr 0,5 ccm abgetötete Lymphe (1:10). Abends 5 Uhr 9,5 ccm derselben Lymphe.

22. 6. – 30. 6. Temp. 38,7 – 39,1.

1. 7. Temp. 38,9.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10) kutan 0,25 ccm unverdünnt.

2. 7. Temp. 38,7. An den 5 intrakutanen Impfstellen leicht erhabene rote Infiltrationen von 2 cm Durchmesser ohne scharfe Begrenzung. Die Impffläche leicht infiltriert und gerötet.

3. 7. Temp. 38,9. Die Infiltrationen nur noch 1,2 bis 1,5 cm groß, doch stärker erhaben und derber. Die Rötung besonders im Zentrum intensiver. Die Impffläche mittelfark infiltriert und gerötet, derb. Am Rande viele rote hirsekorngroße Knötchen.

4. 7. Temp. 38,9. Befinden leicht getrübt. 5 halb-

kugelig vorspringende, derbe, intensiv gerötete 1,2 cm Papeln. Die Impffläche stark infiltriert, derb und gerötet. Randknötchen noch ausgeprägter.

5. 7. Temp. 38,7. Papeln 1 cm groß, nicht mehr so stark vorgewölbt, aber kräftig gerötet und derb. Die Impffläche wie gestern, z. T. mit weißlichen Krusten bedeckt. Randknötchen zahlreich, z. T. konfluierend.

6. 7. Temp. 38,5 Papeln 1 cm groß, nur noch leicht vorspringend, derb, gerötet, ohne scharfe Begrenzung und mit Schüppchen bedeckt. Die kutane Impffläche schwach infiltriert, gerötet und leicht verkrustet. Randknötchen wie gestern.

7. 7. Temp. 38,6. Papeln erbsengroß und schwach gerötete. Impffläche ohne Veränderung. Die Randknötchen bilden sich zurück.

8. 7. Temp. 38,8. Papeln linsengroß, kaum noch fühlbar und leicht gerötet. Infiltration der Impffläche und Randknötchen verschwunden.

9. 7. Temp. 39,0. Papeln bis auf kleine Vernarbungen zurückgebildet. Impffläche mit leichten Krusten bedeckt, sonst ohne Befund.

Kaninchen Nr. 6, Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,7. Gewicht 1330 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6. - 10. 6. Temp. 38,7 - 38,9.

11. 6. Temp. 38,6.

II. Impfung intravenös l. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. - 15. 6. Temp. 38,7 - 39,2.

16. 6. Temp. 38,9.

III. Impfung intravenös r. Ohrvene 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10). 15 Minuten nach der Impfung

starke Unruheerscheinungen und frequente Atmung.
Dauer des Anfalls ca. 20 Minuten.

17. 6. — 20. 6. Temp. 38,9 — 39,0.

21. 6. Temp. 39,0.

IV. Impfung intravenös l. Ohrvene 12 Uhr mit-
tags 0,5 ccm abgetötete Lymphe (1 : 10). 5 Uhr abends
9,5 ccm derselben Lymphe.

22. 6. — 30. 6. Temp. 38,1 — 38,9. Das Tier magert
stark ab. Befinden im Übrigen gut.

1. 7. Temp. 38,9. Gewicht 1080 gr.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan
0,5 ccm (1 : 10). Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

2. 7. Temp. 38,7. An den 5 intrakutanen Impfstellen 1,5 cm große, leicht erhabene Infiltrationen ohne scharfe Begrenzung. Die Impffläche mittelftark infiltriert und gerötet.

3. 7. Temp. 39,1. Die Infiltrationen nur noch 1,2 cm groß, jedoch stärker gerötet. Die Impffläche intensiver gerötet, sonst wie geltern. Am Rande einige hirsekorngroße Knötchen.

4. 7. Temp. 39,6. 1 cm große, stark vorspringende und gerötete derbe Papeln. Die Impffläche noch stärker infiltriert, derb und gerötet. Randknötchen vermehrt.

5. 7. 8. 7. Die Rückbildung der Papeln und Impffläche geht in gleicher Weise vor sich wie bei den Paralleltier Nr. 5.

9. 7. Papeln bis auf leichte Vernarbungen verschwunden. Die Impffläche mit geringen Krusten bedeckt.

Kaninchen Nr. 7, Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,9. Gewicht 1310 gr. Allgemeinbef. gut.

1. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe.
(1 : 10).

7. 6. – 10. 6. Temp. 38,6 – 39,1.

11. 6. Temp. 38,5.

II. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe.
(1 : 10).

12. 6. – 20. 6. Temp. 38,8 – 39,1.

21. 6. Temp. 38, 7.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan
0,5 ccm (1 : 10) Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

22. 6. Temp. 38,6. An den 5 intrakutanen Impf-
stellen starke talergroße Infiltrationen mit intensiv ge-
rötetem Fleck im Zentrum. Die Impffläche dunkelrot
verfärbt, leicht infiltriert und mit Blutkrusten bedeckt.

23. 6 Temp. 39,6. Infiltrationen stark zurückge-
gangen, sonst wie gestern. Die Impffläche kräftiger in-
filtriert, derb und intensiv rot, z. T. mit Blutkrusten
bedeckt.

24. 6. Temp. 40,1. Befinden getrübt. 1 - 1,2 cm
große, halbkugelig vorspringende, derbe und scharlach-
rot verfärbte Papeln. Die Impffläche sehr stark infiltriert
und gerötet, derb. Am Rande einzelne hirsekorngroße
rote Knötchen.

25. 6. Temp. 38,8. Papeln 1 – 1,1 cm groß, derb
jedoch nicht mehr so stark vorspringend und gerötet
wie gestern. Die Infiltration und Rôte der Impffläche
ebenfalls etwas zurückgegangen. Randknötchen ver-
mehrt. Leichte Krusten und Borken auf der Impffläche.

26. 6. Temp. 38,5. Papeln 1 cm groß, schwach
vorspringend, derb, gerötet und mit Schüppchen be-
deckt. Die Impffläche nur noch schwach infiltriert, ge-
rötet und z. T. verkruftet. Randknötchen wie gestern.

27. 6. Temp. 38,8. Papeln und kutane Impffläche
wie gestern. Randknötchen im Zurückbilden.

28. 6. Temp. 38,6. Papeln 0,8 cm groß und leicht gerötet. Impffläche schwach infiltriert, gerötet und mit leichten Krusten bedeckt. Randknötchen zum größten Teil verschwunden.

29. 6. Temp. 38,5. Papeln nur noch schwach vorspringend und nicht mehr gerötet. Impffläche wie gelstern.

30. 6. Temp. 38,7. Papeln kaum noch fühlbar.

1. 7. Temp. 38,5. Papeln und Impffläche bis auf kleine Vernarbungen ohne Befund.

Kaninchen Nr. 8, Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,6. Gewicht 1520 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe. (1:10)

7. 6. – 10. 6. Temp. 38,6 – 38,9.

11. 6. Temp. 38,7.

II. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. – 20. 6. Temp. 38,5 – 39,0.

21. 6. Temp. 38,9.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10) Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

22. 6. Temp. 38. An den 5 intrakutanen Impfstellen kirschgroße leicht erhabene Infiltrationen mit gerötetem Zentrum. Impffläche schwach infiltriert, stark gerötet.

23. 6. Temp. 39,2. Infiltrationen etwas zurückgegangen, aber stärker gerötet. Die Impffläche stark infiltriert, intensiv gerötet, z. T. mit Blutkrusten bedeckt.

24. 6. Temp. 38,8. 1,4 cm große, derbe, halbkugelig vorspringende, leicht gerötete Papeln. Die Impffläche stark infiltriert, derb, intensiv rot und z. T. mit Krusten bedeckt. Am Rande viele hirsekorngroße rote Knötchen.

25. 6. Temp. 38,8. Papeln auf 1,2 cm zurückgegangen. Sonstiger Befund wie gestern.

26. 6. – 2. 7. Rückbildung der Reaktionserrscheinungen in gleich laufender Weise wie bei dem Paraleltier Nr. 7.

3. 7. Papeln bis auf kleine Vernarbungen verschwunden.

Kaninchen Nr. 9. Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,6. Gewicht 1360 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6. – 10. 6. Temp. 38,6 – 38,9.

11. 6. Temp. 38,8.

II. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. – 15. 6. Temp. 38,6 – 39,1.

16. 6. Temp. 38,9.

III. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

17. 6. – 25. 6. Temp. 38,7 – 39,2.

26. 6. Temp. 38,8.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10). Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

27. 6. Temp. 38,7. An den 5 intrakutanen Injektionsstellen leicht erhabene, weiche, schwach gerötete Infiltrationen von 2 cm Durchmesser. Impffläche leicht infiltriert, weich, gerötet und z. T. mit Blutkrusten bedeckt.

28. 6. Temp. 39,0. Die Infiltrationen etwas kleiner im Umfang, aber stärker vorspringend und gerötet. Die Impffläche wie gestern.

29. 6. Temp. 39,6. Befinden leicht getrübt. 5 derbe,

halbkugelig vorspringende, stark gerötete 1 cm große Papeln. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet, derb, z. T. mit Krusten bedeckt. Am Rande einige hirsekorngroße Knötchen.

30. 6. Temp. 38,8. Papeln 0,9 cm groß, nicht mehr so stark vorspringend, aber derb und gerötet. Impffläche wie gestern. Wenige Randknötchen.

1. 7. Temp. 38,5. Papeln 0,8 cm groß, mittelstark vorspringend derb und gerötet. Impffläche leicht infiltriert und gerötet, z. T. mit weißlichen Krusten bedeckt.

2. 7. Temp. 38,7. Papeln nur mehr leicht erhaben mit Schüppchen bedeckt. Sonstiger Befund wie gestern. Randknötchen bilden sich zurück.

3. 7. Temp. 38,9. Papeln noch mehr zurückgegangen. Impffläche leicht infiltriert und gerötet. Randknötchen verschwunden.

4. 7. Temp. 38,8. Papeln linsengroß, kaum fühlbar.

5. 7. Temp. 38,9. Papeln bis auf klein Narben verschwunden. Auf der Impffläche leichte Krusten, sonst ohne Befund.

Kaninchen Nr. 10. Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,9. Gewicht 1510 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6. – 10. 6. Temp. 38,8 – 39,1.

11. 6. Temp. 38,9.

II. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6. – 15. 6. Temp. 39,0 – 39,2.

16. 6. Temp. 38,9.

III. Impfung subkutan 10 ccm. abgetötete Lymphe (1 : 10).

17. 6. — 25. 6. Temp. 38,6 — 39,2.

26. 6. Temp. 38,8.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1 : 10). Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

27. 6. Temp. 38,6. An den 5 intrakutanen Impfstellen leichte, erhabene, weiche, schwach gerötete Infiltrationen von 2,5 cm Durchmesser. Die Impffläche leicht infiltriert und gerötet, z. T. mit Blutkrusten bedeckt.

28. 6. Temp. 39,2. Die Infiltrationen auf 1,5 cm zurückgegangen von derberer Konsistenz und stärker gerötet als gestern. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet, z. T. mit Krusten bedeckt.

29. 6. Temp. 39,6. 5 halbkugelig vorspringende, derbe, stark gerötete Papeln von 1 — 1,2 ccm Durchmesser. Die Impffläche stark infiltriert und derb. Am Rande hirsekorngroße rote Knötchen.

30. 6. Temp. 38,9. Befund wie gestern. Randknötchen vermehrt, weißliche Krusten auf der Impffläche.

1. 7. Temp. 38,8. Papeln nicht mehr so stark vorspringend.

2. 7. — 5. 7. Weitere Rückbildung wie beim Paralleltier Nr. 9.

6. 7. Papeln und Impffläche vernarbt.

Kaninchen Nr. 11. Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,9. Gewicht 1290 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1 : 10).

7. 6. — 10. 6. Temp. 39,0 — 39,2.

11. 6. Temp. 39,0.

II. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1 : 10)

12. 6. – 15. 6. Temp. 38,9 – 39,3.

16. 6. Temp. 39,1.

III. Impfung subkutan 10 ccm. abgetötete Lymphe (1:10).

17. 6. – 20. 6. Temp. 38,8 – 39,2.

21. 6. Temp. 38,7.

IV. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

22. 6. – 30. 6. Temp. 38,6 – 39,2.

1. 7. Temp. 38,8.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10). Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

2. 7. Temp. 38,6. An den 5 intrakutanen Impfstellen ganz schwach erhabene, weiche Infiltrationen von 2 cm Durchmesser. Die Impffläche mittelftark infiltriert und gerötet.

3. 7. Temp. 38,9. Die Infiltrationen 1,8 cm groß, stärker vorspringend, derb-weich und gerötet. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet. Wenige rote hirsekorngroße Randknötchen.

4. 7. Temp. 38,7. 5 sehr stark vorspringende, derbe, gerötete Papeln von 1,5 cm Durchmesser. Impffläche wie gestern. Die Randknötchen vermehren sich.

5. 7. Temp. 39,5. Befinden leicht getrübt. Papeln wie gestern. Impffläche noch stark infiltriert, aber weicher und von kleinen Krusten bedeckt.

6. 7. Temp. 39,0. Papeln im Zurückgehen, derb und mit Schüppchen bedeckt. Impffläche nur noch leicht infiltriert und gerötet.

7. 7. Temp. 39,3. Papeln 0,9 cm groß, mittelftark erhaben, ohne scharfe Begrenzung, gerötet. Knötchen bilden sich zurück.

8. 7. Temp. 39,1. Papeln 0,8 cm groß, kaum fühlbar infiltriert und leicht gerötet. Die Impffläche schwach gerötet und mit Krusten bedeckt. Randknötchen verschwunden.

9. 7. Temp. 39,0. Papeln wie gestern und Impffläche ohne Befund.

10. 7. Temp. 38,8. Papeln kaum noch fühlbar.

11. 7. Temp. 38,7. Papeln bis auf kleine Vernarbung verschwunden.

Kaninchen Nr. 12. Albino männlich.

6. 6. Temp. 38,9. Gew. 1530 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

7. 6.—10. 6. Temp. 38,9—39,2.

11. 6. Temp. 39,2.

II. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

12. 6.—15. 6. Temp. 38,6—38,9.

16. 6. Temp. 38,6.

III. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

17. 6.—20. 6. Temp. 38,7—39,1.

21. 6. Temp. 38,7.

IV. Impfung subkutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

22. 6.—30. 6. Temp. 38,6—39,2.

1. 7. Temp. 38,6.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10). Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

2. 7. Temp. 38,7. Die 5 intrakutanen Impfstellen in großem Umfange ohne scharfe Begrenzung leicht infiltriert und gerötet.

3. 7. Temp. 39,0. Die Infiltration nur noch 1,5 cm groß, aber stärker vorspringend und gerötet. Die Impffläche wie gestern.

4. 7. Temp. 38,9. Befinden getrübt. 1,5 cm große halbkugelig vorspringende, derbe und stark gerötete Papeln. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet, derb und z. T. mit Krusten bedeckt. Viele rote Hirsekorngroße Randknötchen.

5. 7. Temp. 39,1. Befund wie gestern.

6. 7. Temp. 38,6. Papeln 1,2 cm groß, stark vorspringend und gerötet, derb. Die Impffläche schwach infiltriert, leicht gerötet und mit Krusten bedeckt. Randknötchen bilden sich zurück.

7. 7. — 10. 7. Weitere Rückbildung wie bei dem Paralleltier Nr. 11.

11. 7. Pappel bis auf kleine Vernarbungen verschwunden.

Kaninchen Nr. 13. Albino männlich.

16. 6. Temp. 39,3. Gew. 2450 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

17. 6. — 20. 6. Temp. 39,1 — 39,4.

21. 6. Temp. 39,2.

II. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

22. 6. — 25. 6. Temp. 39,1 — 39,2.

26. 6. Temp. 39,0.

III. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

27. 6. — 30. 6. Temp. 39,1 — 39,2.

1. 7. Temp. 39,2.

IV. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

2. 7. - 10. 7. Temp. 39,0 - 39,3.

11. 7. Temp. 39,1.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5 ccm (1:10); Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

12. 7. Temp. 39,5. An den 5 intrakutanen Impfstellen leichte erhabene, intensiv rote Anschwellungen von 1,5 - 1,8 cm Durchmesser und ohne scharfe Abgrenzung. Die kutane Impffläche leicht infiltriert und intensiv gerötet.

13. 7. Temp. 38,8. Die Infiltrationen sind auf 1,3 cm zurückgegangen, aber stärker erhaben und gerötet. Die Impffläche mitteltark infiltriert und gerötet, bedeckt mit vielen hirsekorngroßen Knötchen.

14. 7. Temp. 39,5. 1,2 cm große, halbkugelig vorspringende, derbe und intensiv rote Papeln. Die Impffläche leicht infiltriert und gerötet, überfät mit vielen zum Teil konfluierenden hirsekorngroßen roten Knötchen.

15. 7. Temp. 39,3. Papeln auf 1 cm zurückgegangen und nicht mehr so stark vorspringend. Impffläche mit weißlichen Krusten bedeckt. Sonst wie gestern.

16. 7. Temp. 39,0. Papeln bedecken sich mit Schüppchen. Sonstiger Befund wie gestern.

17. 7. Temp. 39,1. Papeln nur noch 0,8 cm groß, schwach erhaben, aber stark gerötet und derb, mit Schüppchen bedeckt. Die Impffläche leicht gerötet und verkrustet. Knötchen verschwunden.

18. 7. Temp. 38,8. Papeln kaum noch fühlbar, jedoch stark gerötet und mit Schüppchen bedeckt. Impffläche noch kräftig gerötet z. T. schon vernarbt.

19. 7. Temp. 38,9. Papeln und Impffläche bis auf leichte Vernarbungen verschwunden.

Kaninchen Nr. 14. Albino weiblich.

16. 6. Temp. 39,4. Gew. 2400 gr. Allgemeinbef. gut.

I. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe
(1 : 10).

17. 6. — 20. 6. Temp. 39,1 — 39,2.

21. 6. Temp. 39,2.

II Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe
(1 : 10)

22. 6. — 25. 6. Temp. 39,0 — 39,5.

26. 6. Temp. 39,3.

III. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe
(1 : 10)

27. 6. — 30. 6. Temp. 39,1 — 39,4.

1. 7. Temp. 39,3.

IV. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe
(1 : 10)

2. 7. — 10. 7. Temp. 39,0 — 39,4.

11. 7. Temp. 39,1.

Reinfektion mit virulenter Lymphe. Intrakutan 0,5
ccm (1 : 10) Kutan 0,25 ccm unverdünnt.

12. 7. Temp. 38,9. An den 5 intrakutanen Impf-
stellen leichte erhabene, weiche Anschwellungen von
2 cm Durchmesser ohne scharfe Begrenzung und mit
stark gerötetem Zentrum. Die Impffläche kräftig in-
filtriert und gerötet.

13. 7. Temp. 40,0. Befinden getrübt. Die In-
filtrationen nur noch 1 cm groß, leicht erhaben, aber
intensiv gerötet. Die Impffläche stark infiltriert, derb
und dunkelrot gefärbt, am Rande viele hirsekorngroße
rote Knötchen.

14. 7. Temp. 40,1. Befinden getrübt. Halbkugelig
vor springende, intensiv gerötete und derbe Papeln von

1,1 cm Durchmesser. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet, mit weißlichen Krusten und Knötchen bedeckt.

15. 7. Temp. 39,0. Papeln nicht mehr so stark vorspringend. Sonstiger Befund wie gestern.

16. 7. - 18. 7. Rückgang in gleicher Weise wie beim Paralleltier Nr. 13.

19. 7. Papeln bis auf kleine Vernarbungen verschwunden. Impffläche noch leicht verkrustet.

Kaninchen Nr. 15. Albino weiblich.

21. 6. Temp. 39,1. Gew. 1470 gr. Befinden gut

I. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

22. 6.-25. 6. Temp. 38,7-39,0.

26. 6. Temp. 38,8.

II. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

27. 6.-30. 6. Temp. 38,5-39.

1. 7. Temp. 38,8.

III. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

2. 7.-10. 7. Temp. 38,8-39,0

11. 7. Temp. 38,8.

Reinfektion mit virulenter Lymphe intrakutan 0,5 cm (1:10). Kutan 0,25 cm. unverdünnt.

12. 7. Temp. 38,6. An den 5 intrakutanen Impfstellen leicht erhabene und gerötete Anschwellungen von 2 cm Durchmesser, ohne scharfe Begrenzung. Die Impffläche schwach infiltriert und stark gerötet.

13. 7. Temp. 38,6. Die Infiltrationen stark zurückgegangen, leicht erhaben und schwach gerötet. Die

Impffläche ebenfalls leicht infiltriert, schwach gerötet, und überfät mit vielen hirsekorngroßen stärker geröteten Knötchen.

14. 7. Temp. 39,4. 1 cm große, stark vorspringende und gerötete derbe Papeln. Die Impffläche leicht infiltriert und gerötet, bedeckt mit weißlichen Krusten und zahlreichen Knötchen.

15. 7. Temp. 39,0. Befund wie gestern.

16. 7. Temp. 39,1. Papeln auf 0,8 cm zurückgegangen, leicht erhaben und gerötet, derb und mit Schüppchen bedeckt. Die Knötchen im Zurückbilden.

17. 7. Temp. 38,9. Papeln nur noch schwach erhaben, erbsengroß und leicht gerötet. Die Impffläche mit kleinen Krusten bedeckt. Knötchen verschwunden.

18. 7. Temp. 38,7. Papeln kaum noch fühlbar. Impffläche leicht verkrustet.

19. 7. Temp. 38,9. Leichte Vernarbungen der Papeln und Impffläche.

Kaninchen Nr. 16. Albino weiblich.

21. 6. Temp. 38,9, Gew. 1700 gr. Befinden gut.

I. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

22. 6.-25. 6. Temp. 38,8-39,0.

26. 6. Temp. 38,6.

II. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

27. 6.-30. 6. Temp. 38,5-38,8.

1. 7. Temp. 38,9.

III. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

2. 7.-10. 7. Temp. 38,7-39,1.

11. 7. Temp. 38,9.

Reinfektion mit virulenter Lymphe intrakutan 0,5 ccm (1:10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

12. 7. Temp. 39,1. An den 5 intrakutanen Impfstellen leichte weiche Anschwellungen von ca. 2 cm Größe mit intensiv rot verfärbter Mitte. Die Impffläche leicht infiltriert aber stark gerötet.

13. 7. Temp. 39,5. Befinden leicht getrübt. Die Anschwellungen sind auf 1 cm zurückgegangen, aber stärker erhaben und intensiv gerötet. Die Impffläche leicht infiltriert und stark gerötet. Am Rande viele hirsekorngroße rote Knötchen.

14. 7. Temp. 39,0. 0,9 cm große, halbkugelig vorspringende, derbe und stark gerötete Papeln. Die Impffläche mittelftark infiltriert, stark gerötet, bedeckt mit weißlichen Krusten und hirsekorngroßen intensiv roten Knötchen.

15. 7. Temp. 38,8. Papeln nicht mehr so stark vorspringend und gerötet. Impffläche wie gestern.

16. 7.-18. 7. Rückgang wie beim Paralltier Nr. 15.

19. 7. Papeln und Impffläche vernarbt.

Kaninchen Nr. 17. Albino weiblich.

21. 6. Temp. 39,9. Gew. 1820 gr. Befinden gut.

I. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

22. 6.-25. 6. Temp. 39,0-39,3.

26. 6. Temp. 39,0.

II. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymphe (1:10).

27. 6.-6. 7. Temp. 38,7-39,3.

7. 7. Temp. 39,1.

Reinfektion mit virulenter Lymphe intrakutan 0,5 ccm (1:10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

8. 7. Temp. 39,2. An den 5 intrakutanen Impfstellen leicht erhabene und gerötete weiche Infiltrationen von ca. 1,2 cm Durchmesser. Die Impffläche leicht infiltriert, aber stark gerötet.

9. 7. Temp. 40,1. Befinden getrübt. Die Infiltrationen stärker vorspringend und gerötet. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet.

10. 7. Temp. 39,6. Stark vorspringende, derbe, intensiv rote Papeln von 1,2 cm Durchmesser. Die Impffläche stark infiltriert und intensiv gerötet, aber mit Schüppchen bedeckt, viele rote, hirsekorngroße Randknötchen.

11. 7. Temp. 38,7. Unwesentliche Veränderung.

12. 7. Temp. 38,8. Papeln nur mehr 1 cm groß, leicht erhaben, derb und gerötet, mit Schüppchen bedeckt. Die Impffläche leicht gerötet und infiltriert, mit Krusten überzogen. Randknötchen verschwunden.

13. 7. Temp. 38,8. Befund wie gestern.

14. 7. Temp. 38,9. Papeln kaum noch fühlbar, leicht erhaben, gerötet und mit Schüppchen bedeckt. Die Impffläche nicht mehr infiltriert, mit Krusten überzogen.

15. 7. Temp. 39,0. Papeln bis auf kleine Vernarbungen verschwunden, Impffläche nur leicht infiltriert.

Kaninchen Nr. 18. Albino männlich.

21. 6. Temp. 39,4. Gew. 1470 gr. Befinden gut.

I. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymph (1:10).

22. 6.-25. 6 Temp. 38,8-39,0.

26. 6. Temp. 38,6.

II. Impfung intrakutan 10 ccm abgetötete Lymph (1:10).

27. 6.-6. 7. Temp. 38,6-39,2.

7. 7. Temp. 39,1.

Reinfektion mit virulenter Lymphe intrakutan 0,5 ccm (1 : 10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

8. 7. Temp. 39,0. An den 5 intrakutanen Impfstellen leicht erhabene, weiche im Zentrum gerötete Infiltrationen von 1,2 cm Durchmesser. Die Impffläche schwach infiltriert, stark gerötet.

9. 7. Temp. 39,3. Die Infiltrationen stärker vorspringend und derb. Die Impffläche mittelfark infiltriert, kräftig gerötet und derb.

10. 7. Temp. 38,9. Stark vorspringende, derbe und intensiv gerötete Papeln von 1 cm Durchmesser. Die Impffläche stark infiltriert und gerötet, derb, z. T. mit Krusten bedeckt. Viele z. T. konfluierende hirsekorngroße rote Randknötchen.

11. 7. Temp. 39,0. Ohne Veränderung.

12. 7. Temp. 38,6. Papel nur noch 0,8 cm groß leicht erhaben, kräftig gerötet mit Schüppchen bedeckt. Die Impffläche leicht infiltriert und gerötet, z. T. verkrustet. Die Randknötchen im Zurückbilden.

13. 7.-14. 7. Rückbildung wie bei dem Paralleltier Nr. 17.

15. 7. Papeln bis auf kleine Vernarbungen verschwunden, Impffläche noch leicht verkrustet.

Zusammenfassung des Ergebnisses.

Von den 18 Versuchstieren starben Nr. 1 an *Coccidiosis* und Kaninchen Nr. 4 an einer Anaphylaxie gegen das injizierte Antigen. Infolge der Versuchsanordnung mit Paralltieren wird das Ergebnis durch den Verlust dieser beiden Tiere nicht beeinträchtigt. Um weitere Verluste durch anaphylaktische Erscheinungen, die bei Kaninchen Nr. 3-6 infolge der dritten Impfung mit abgetöteter Lymphe auftraten, zu verhindern, wurden 5 Stunden vor der 4. Impfung 0,5 ccm abgetötete Lymphe (1:10) intravenös injiziert. Die 4. Impfung mit 9,5 ccm derselben Lymphe wurde darauf reaktionslos vertragen. Bei den Kaninchen, die auf intrakutanem und subkutanem Wege geimpft wurden, traten, wie zu erwarten war, anaphylaktische Erscheinungen nicht auf. Der Unterschied beruht wohl darauf, daß bei diesen beiden Impfmethoden die Lymphe langsam in die Blutbahn übergeht und die Anaphylaxie aufgehoben ist, ehe tödliche Mengen reforbiert sind.

Abgesehen von geringen individuellen Schwankungen zeigen im übrigen alle Versuchstiere ungefähr das gleiche Bild. Die Kaninchen haben die Vorimpfung mit abgetöteter Lymphe nach den drei angewandten Methoden mit Ausnahme von geringen, kurzdauernden Infiltrationen nach dem intrakutanen Verfahren ohne lokale oder allgemeine Reaktionsercheinungen vertragen. Die Reinfektion mit virulenter Lymphe, die erst am

10. Tage nach der letzten Vorimpfung stattfindet, um dem Organismus Zeit zur evtl. Immunisierung zu lassen ruft folgende Reaktionen hervor. Bei sämtlichen Tieren tritt eine Temp.-Steigerung ein, die ihr Maximum bei 4 Kaninchen 2 Tage, bei 10 Tieren 3 Tage und bei den übrigen zwei 4 Tage nach der Reinfektion erreicht und zwar überschreitet bei 12 Tieren die Temp. die gefundene normale Höchstgrenze von 39,5°, bei den übrigen 4 Kaninchen wird zwar diese Grenze nicht erreicht, doch ist auch bei diesen ein deutlicher Aufstieg zu konstatieren. Der verschiedene Eintritt der Höchsttemperatur steht in keinem Zusammenhange mit der Art der Vorbehandlung, sondern scheint auf individuelle verschiedene Reaktionsfähigkeit zu beruhen. Die intrakutane Reinfektion bewirkt bei sämtlichen Tieren am ersten Tage eine leicht erhabene, weiche, oft mehr oder weniger stark gerötete Infiltration von 1,2-2 cm Durchmesser. Am 2. Tage nehmen diese Infiltrationen gewöhnlich an Umfang ab, springen dafür etwas stärker hervor, sind mehr gerötet und von etwas derberer Konsistenz. Am 3. Tage haben sich starke, meist direkt halbkugelig vorspringende, derbe, intensiv gerötete oder scharlachrotverfärbte Papeln von 1-1,8 cm Durchmesser gebildet und damit den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht. Der 4. Tag zeigt gewöhnlich das gleiche Bild, doch ist bei einigen Tieren schon der Anfang eines Rückganges der Erscheinung zu bemerken. Am 5. Tage bilden sich bei allen Tieren die Papeln merklich zurück, sie sind nicht mehr so intensiv gerötet und von der ausgesprochenen, derben Konsistenz. Ihre Oberfläche beginnt leicht zu schrumpfen. Bis zum 7. Tage sind die Papeln gewöhnlich nur mehr erbsengroß, kaum fühlbar, leicht erhaben und schwach

gerötet. Am 8. Tage hat im allgemeinen der Reaktionsprozess ein Ende gefunden. Die Papeln sind bis auf leichte Vernarbungen verschwunden. Bei einigen Tieren verzögert sich diese Rückbildung bis zum 9., 10. und 11. Tage. Die kutane Reinfektionsmethode bewirkt gewöhnlich einen analogen Reaktionsvorgang. Am ersten Tage nach der Reinfektion ist die Impffläche durchweg leicht infiltriert, stark gerötet und oft mit Blutkrusten bedeckt. Am 2. Tage verstärkt sich die Infiltration bedeutend, bei einigen Tieren bilden sich rote, hirsekorngroße Knötchen, die auf der Impffläche selbst z. T. konfluieren, am Rande vereinzelt stehen. Diese Knötchen sind als kleine Impfpapeln aufzufassen und erst vollständig ausgebildet am 3. bis 4. Tage. An diesen hat auch die Infiltration ihren Höhepunkt erreicht. Sie fühlt sich mehr oder weniger derb an und ist oft dunkelrot verfärbt. Die ganze Impffläche macht den Eindruck zusammenfließender Impfpusteln. Die Rückbildung des Prozesses beginnt fast bei allen Tieren deutlich am 5. Tage, indem die Knötchen unter Verkrustung schrumpfen und die Infiltrationen deutliche Abnahme zeigen, während die Rötung noch weiter besteht. Am 6. Tage sind die kleinen Knötchen kaum noch sichtbar, oder ganz verschwunden, die Oberfläche ist stark verkrustet. Am 7. Tage ist die Infiltration meistens vollständig vergangen, die Impffläche nur noch etwas gerötet und z. T. mit Krusten bedeckt. Vom 8.-10. Tage haben sich die letzten Reaktionsercheinungen bis auf leichte Krusten und Vernarbungen gelöst.

Zusammenfassend läßt sich demnach feststellen, daß der Höhepunkt der lokalen Reaktionsercheinungen nach beiden Reinfektionsverfahren durchweg bei allen Tieren 3 Tage nach stattgefundener Reinfektion erreicht

ist. Der vierte Tag zeigte im allgemeinen noch das gleiche Bild, doch zeigt sich schon bei einigen Tieren eine eben bemerkbare Rückbildung der Papeln und Infiltrationen. Vom 5. Tage an nehmen die lokalen Reaktionserrscheinungen bei sämtlichen Tieren in ziemlich gleichmäßiger Weise ab und sind nach 8-11 Tagen bis auf leichte Vernarbungen verschwunden. Die geringen Abweichungen bei einzelnen Tieren dürften auf individuelle Verschiedenheiten zurückzuführen sein. Bei allen Versuchstieren zeigte sich also nach der Reinfektion mit virulenter Lymphe das typische Bild der Kaninchenpocken und zwar in gleicher Stärke bei den zwei, drei und viermal mit abgetöteter Lymphe vorbehandelten Tieren. Ein Unterschied in der Wirkung der intravenösen gegenüber der subkutanen oder intrakutanen Impfmethode konnte nicht festgestellt werden. Die geringen Unterschiede, welche nach den Versuchen von Lechner anscheinend bei intrakutaner Vorbehandlung gegenüber den anderen Methoden sich zeigten, konnten bei unseren Versuchen nicht gefunden werden. Es darf daher nach unseren Versuchen mit Bestimmtheit ausgesprochen werden, daß Kaninchen durch mehrmalige, in bestimmten Intervallen vorgenommene intravenöse, intrakutane und subkutane Impfungen mit abgetöteter Schutzpockenlymphe nicht zu immunisieren sind. Obwohl zur Impfung die für ein Kaninchen sehr große Menge von einem ccm Lymphe angewandt und die Zahl der aufeinanderfolgenden Injektionen bis auf 4 gesteigert wurde, war die von anderer Seite angeblich beobachtete Immunität nach Behandlung mit abgetöteter Vakzine in keinem unserer Fälle zu erreichen. Die negativen Ergebnisse, welche von Lechner bei einmaliger Einverleibung steigender Mengen von abgetö-

ter Schutzpockenlymphe erhalten wurden, haben daher durch unsere Versuche, welche mit zwei bis viermaligen Injektionen einer gleichbleibenden Menge angestellt wurden, ihre volle Bestätigung erfahren. Diese Ergebnisse stehen gleichzeitig in völliger Übereinstimmung mit der Tatsache, daß in der Veterinärmedizin Schutzimpfungen mit abgetötetem Virus irgend welche Verbreitung nicht gefunden haben. Die von Friedberger hervorgehobene Auffassung, daß auch die im allergrößten Maßstabe durchgeführten Schutzimpfungen mit abgetötetem Impfstoff gegen Cholera und Typhus nicht zur Immunität führen, erfährt hierdurch eine gewisse Bestätigung, wenn auch nicht angenommen werden darf, daß die für Vakzine bei einem Kaninchen gefundenen Tatsachen ohne weiteres auf die Thyphus- und Cholera-Schutzimpfungen beim Menschen übertragen werden dürfen.

Nachdem diese negativen Immunisierungsversuche mit abgetöteter Vakzine vorlagen, erschien es weiterhin von Interesse, festzustellen, inwieweit das lebende Virus Immunität zu erzeugen im Stande ist, und dabei vor allem die Frage zu beantworten, ob jede auch noch so geringe Infektion, welche zu deutlich nachweisbaren krankhaften Veränderungen führt, eine Immunisierung des befallenen Organismus bedingt. Die einfache Überlegung läßt nämlich die Vorstellung zu, daß auch bei Impfung mit virulentem Material erst von einer gewissen Menge ab, oder erst von einer gewissen Höhe der Krankheitserscheinungen an, der befallene Organismus zur Bildung von Immunkörpern angeregt wird. Um dieser Frage näher zu treten, habe ich einen

zweiten Versuch an weiteren 10 Kaninchen, ebenfalls Albinos, vorgenommen. Die 5 ersten Kaninchen wurden auf intrakutanem, die zweiten 5 auf kutanem Wege mit virulenter Lymphe geimpft und zwar Kaninchen 1 und 6 mit 1 ccm einer Verdünnung von 1:10, Kaninchen 2 und 7 mit einer Verdünnung von 1:100, Kaninchen 3 und 8 mit gleicher Dosis von 1:1000, Kaninchen 4 und 9 von 1:10000 und endlich Kaninchen 5 und 10 von 1:100000. Die Reinfektion wurde am 17. Tage mit virulenter Lymphe auf kutanem und intrakutanem Wege ausgeführt. Die Impftechnik und der Impfstoff sind die gleichen wie beim ersten Versuch.

Folgende Tabelle diene zur Übersicht:

Versuchsanordnung vom II. Versuch.

Kaninchen Nr.	Impfmethode	Stärke der Verdünnung	I. Impfung am:	Reinfektion am:
1	intrakutan	1:10	30. 6.	17. 7.
2	"	1:100	30. 6.	17. 7.
3	"	1:1000	30. 6.	17. 7.
4	"	1:10000	30. 6.	17. 7.
5	"	1:100000	30. 6.	17. 7.
6	kutan	1:10	30. 6.	17. 7.
7	"	1:100	30. 6.	17. 7.
8	"	1:1000	30. 6.	17. 7.
9	"	1:10000	30. 6.	17. 7.
10	"	1:100000	30. 6.	17. 7.

Die Ergebnisse des Versuchs gehen aus nachfolgenden Protokollen hervor:

Protokoll von Versuch Nr. 2.

Kaninchen Nr. 1. Albino weiblich.

30. 6. Temp. 39,3, Gewicht 2320 gr. Befinden gut.

1. Impfung intrakutan 1 ccm virulenter Lymphe (1:10) 4 Injektionsstellen.

1. 7. Temp. 38,8. Impfstellen im Durchmesser von 2 cm leicht infiltriert und hyperämisch.

2. 7. Temp. 40,2. Befinden getrübt. Infiltrationen stärker erhaben.

3. 7. Temp. 39,0. Sehr stark vorspringende, derbe intensiv rote Papeln von 2 cm Durchmesser.

4. 7. Temp. 38,5 Ohne Änderung.

5. 7. Temp. 38,6. Papei leicht im Zurückgehen, mit Schüppchen bedeckt.

6. 7. Temp. 38,9. Papei nur noch leicht vorspringend, derb, gerötet und mit Schüppchen bedeckt.

7. 7. Temp. 39,0. Weitere Rückbildung.

8. 7. Temp. 39,2. Papeln schwach erhaben und leicht gerötet.

9. 7. Temp. 39,0. Papeln kaum noch fühlbar, schwach gerötet und mit Schüppchen bedeckt.

10. 7. Temp. 38,8. Papeln bis auf leichte Vernarbungen verschwunden.

11. 7.-16. 7. Temp. 38,7-38,9.

17. 7. Temp. 39,0.

Reinfektion intrakutan 0,5 ccm (1:10) kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 39,1. Intrakutane Impfstellen ca. kirschgroß, gerötet. Impffläche hyperämisch.

19. 7. Temp. 39,1. Intrakutane Impfstellen ganz schwach infiltriert und gerötet. Impffläche leicht infiltriert, aber stärker gerötet.

20. 7. Temp. 39,1. Reaktion im Zurückbilden.
Am 21. 7. Temp. 39,1. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 2. Albino männlich.

30. 6. Temp. 39,1. Gewicht 2350 gr. Befinden gut.

1. Impfung intrakutan 1 ccm virulente Lymphe
(1:100). 4 Injektionsstellen.

1. 7. Temp. 39,2. Impfstellen im Durchmesser von
1,5 cm ganz schwach infiltriert und gerötet.

2. 7. Temp. 40,1. Befinden getrübt, Impfstellen
stärker erhaben und intensiver gerötet. -

3. 7. Temp. 39,0. Stark vorspringende, intensiv
gerötete und derbe Papeln.

4. 7. Temp. 38,8. Ohne Änderung.

5. 7. Temp. 38,9. Papeln mit Schüppchen bedeckt.

6. 7. Temp. 39,1. Papeln auf 1,2 cm Durchmesser
zurückgegangen.

7. 7. Temp. 39,0. Papeln immer noch stark
vorspringend, derb und gerötet, aber ohne scharfe
Abgrenzung.

8. 7. Temp. 38,8. Papel auf 1 cm zurückgegangen,
nur noch leicht erhaben.

9. 7. Temp. 39,1. Rückbildung weiter fortgeschritten.

10. 7. Temp. 39,0. Papel kaum noch fühlbar
und leicht gerötet.

11. 7. Temp. 38,9. Papel vernarbt.

12. 7.-16. 7. Temp. 38,7-39,1.

17. 7. Temp. 38,8.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm 1:10, kutan 0,25
ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 39,2. Intrakutane Impfstellen kaum
sichtbar, infiltriert und schwach gerötet. Impffläche
kräftig hyperämisch.

19. 7. Temp. 39,2. An den intrakutanen Impfstellen schwach erhabene und leicht gerötete Infiltrate von 0,9 cm Durchmesser. Impffläche leicht gerötet.

20. 7. Temp. 39,2. Reaktionen im Zurückbilden.

21. 7. Temp. 39,1. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 3, Albino weiblich.

30. 6. Temp. 39,4. Gewicht 2370 gr. Befinden gut

1. Impfung intrakutan 1 ccm virulente Lymphe 1:1000. 4 Injektionsstellen.

1. 7. Temp. 39,1. Impfstellen im Durchmesser von 1,2-1,5 cm, schwach gerötet und leicht infiltriert.

2. 7. Temp. 39,1. Impfstellen stärker infiltriert und gerötet.

3. 7. Temp. 39,3. Stark vorspringende, intensiv gerötete und derbe Papeln von 1,2 cm Durchmesser.

4. 7. Temp. 39,2. Papeln nur noch leicht vorspringend, stark gerötet, 1,1 cm groß.

5. 7. Temp. 38,9. Papeln auf 1 cm zurückgegangen, mit Schüppchen bedeckt.

6. 7. Temp. 39,0. Papeln kaum noch fühlbar.

7. 7. Temp. 38,8. Papeln vernarbt.

8. 7.-16. 7. Temp. 38,7-39,1.

17. 7. Temp. 38,9.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1:10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 38,9. Die intrakutanen Impfstellen im Durchmesser von 1,5 cm leicht infiltriert und gerötet. Impffläche ganz schwach infiltriert, aber stärker gerötet.

19. 7. Temp. 40,0. Befinden getrübt. Die intrakutanen Impfstellen stärker gerötet und erhaben, die Impffläche kräftig infiltriert und gerötet.

20. 7. Temp. 39,4. Stark vorspringende, derbe, intensiv gerötete Papeln von 1,5 cm Durchmesser. Impffläche stark infiltriert und gerötet, derb, bedeckt mit vielen hirsekorngroßen Knötchen und weißlichen Krusten.

21. 7. Temp. 38,8. Papeln schon im Zurückbilden, mit Schüppchen bedeckt, Impffläche ohne Änderung. Einige Randknötchen.

22. 7. Temp. 38,9. Papeln nur noch 1 cm groß, leicht erhaben, derb und mit Schüppchen bedeckt. Impffläche leicht infiltriert, gerötet und schwach verkrustet, Knötchen verschwunden.

23. 7. Temp. 38,8. Rückbildung noch stärker vorgeschritten.

24. 7. Temp. 38,9. Ohne Befund bis auf leichte Vernarbungen.

Kaninchen Nr. 4. Albino weiblich.

30. 6. Temp. 38,7. Gewicht 1350 gr. Befinden gut.

1. Impfung intrakutan 1 ccm virulente Lymphe (1:10000) 4 Injektionsstellen.

1. 7. Temp. 39,1. An den Injektionsstellen leicht hyperämische Flecken.

2. 7. Temp. 39,0. Impfstellen stärker gerötet.

3. 7. Temp. 39,0. Geringe aber deutliche ca. erbsengroße Infiltration und Rötung an den Injektionsstellen.

4. 7. Temp. 38,8. Impfstellen kaum fühlbar und gerötet.

5. 7. Temp. 39,0. Impfstellen nur noch leicht gerötet.

6. 7. Temp. 38,9. Ohne Befund.

7. 7.-16. 7. Temp. 38,7-39,1.

17. 7. Temp. 39,1.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1:10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 38,8. Die intrakutanen Impfstellen sind ganz schwach infiltriert und gerötet. Impffläche ebenfalls leicht infiltriert, aber stärker gerötet.

19. 7. Temp. 40,0. Befinden getrübt. Die intrakutanen Impfstellen im Durchmesser von 1 cm, mittelstark infiltriert und kräftig gerötet. Die Impffläche stärker infiltriert und gerötet als gestern.

20. 7. Temp. 39,5. Stark vorspringende, derbe und intensiv gerötete Papeln von 1 cm Durchmesser. Impffläche stark infiltriert und gerötet, bedeckt mit weißlichen Krusten und Knötchen. Viele hirsekorngroße Randknötchen.

21. 7. Temp. 38,9. Papeln mit Schüppchen bedeckt sonst keine Änderung.

22. 7. Temp. 39,0. Papeln kaum noch fühlbar und leicht gerötet, Impffläche leicht infiltriert und verkrustet, Knötchen verschwunden.

23. 7. Temp. 38,7. Weitere Rückbildung.

24. 7. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 5. Albino weiblich.

30. 6. Temp. 39,2. Gewicht 2750 gr. Befinden gut.

1. Impfung intrakutan 1 ccm virulente Lymphe (1:100000) 4 Injektionsstellen.

1. 7. Temp. 38,9. Leichte hyperämische Flecken an den Impfstellen

2. 7. Temp. 39,0. Wie gestern.

3. 7. Temp. 38,8. Impfstellen in ca. Erbsengröße kaum sichtbar infiltriert und gerötet.

4. 7. Temp. 38,5. Ohne Änderung.

5. 7. Temp. 38,9. Infiltrationen vollständig verschwunden. Leichte rote Flecken.

6. 7. Temp. 39,0. Ohne Befund.

7. 7.-16. 7. Temp. 38,8-39,0.

17. 7. Temp. 39,0.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1:10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 39,2. Die intrakutanen Impfstellen im Durchmesser von 1 cm kaum sichtbar infiltriert und und schwach gerötet. Impffläche ganz schwach infiltriert aber stärker gerötet.

19. 7. Temp. 39,6. Die intrakutanen Impfstellen kräftiger gerötet und infiltriert. Die Impffläche wie gelbern.

20. 7. Temp. 39,6. Stark vorspringende, derbe und scharlachrot verfärbte Papeln von 1,5 cm Durchmesser. Impffläche stark infiltriert und gerötet, derb mit weißlichen Krusten und vielen hirsekorngroßen Knötchen bedeckt.

21. 7. Temp. 39,2. Papeln auf 1,2 cm zurückgegangen. Sonst ohne Änderung.

22. 7. Temp. 38,9. Papeln nur noch 1,1 cm groß, leicht erhaben und gerötet, derb und mit Schüppchen bedeckt. Impffläche leicht infiltriert und mit weißlichen Krusten überzogen. Knötchen verschwunden.

23. 7. Temp. 39,0. Papeln ganz schwach erhaben. Impffläche wie gelbern.

24. 7. Leichte Vernarbungen.

Kaninchen Nr. 6. Albino weiblich.

30. 6. Temp. 39,0. Gewicht 1600 gr. Befinden gut.

1. Impfung. Kutane 1 ccm virulente Lymphe 1:10.

1. 7. Temp. 39,0. Impffläche stark gerötet, leicht infiltriert.

2. 7. Temp. 39,3. Impffläche stark infiltriert und gerötet, am Rande viele hirsekorngroße rote Knötchen

3. 7. Temp. 40,3. Befinden getrübt. Impffläche stark infiltriert und intensiv gerötet, übersät mit vielen hirsekorngroßen Knötchen.

4. 7. Temp. 39,4. Ohne Veränderung.

5. 7. Temp. 39,1. Impffläche kräftig infiltriert, leicht gerötet, bedeckt mit Krusten und stärker geröteten Knötchen, die mit Schüppchen überzogen sind. Eine durch Einteilung der Impffläche in einzelne kleine Felder ermöglichte Zählung der Knötchen ergab eine Anzahl von 4-500 Stück.

6. 7. Temp. 39,0. Impffläche nur noch leicht infiltriert und gerötet, Knötchen gehen zurück.

7. 7. Temp. 39,1. Weitere Rückbildung. Knötchen verschwunden.

8. 7. Temp. 39,2. Impffläche leicht verkrustet, sonst ohne Befund.

9. 7.-16. 7. Temp. 38,7-39,2.

17. 7. Temp. 38,7.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1 : 10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 38,9. Die intrakutanen Impfstellen im Durchmesser von 1,5 cm leicht infiltriert und gerötet. Die Impffläche stark gerötet.

19. 7. Temp. 39,2. Impffläche nur noch ganz leicht gerötet, sonstiger Befund wie geltern.

20. 7. Temp. 39,0. Weitere Rückbildung der Reaktion.

21. 7. Temp. 38,7. Die intrakutanen Impfstellen nur noch ganz schwach gerötet, sonst ohne Befund.

22. 7. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 7. Albino weiblich.

30. 6. Temp. 38,8. Gewicht 1750 gr. Befinden gut.

1. Impfung Kutan 1 ccm virulente Lymphe (1 : 100)

1. 7. Temp. 39,1. Impffläche stark gerötet und schwach infiltriert.

2. 7. Temp. 39,3. Infiltration und Rötung verstärkt.

3. 7. Temp. 39,0. Impffläche stark infiltriert und gerötet, bedeckt mit zahlreichen hirsekorngroßen Knötchen. Ihre Zählung, die auf gleiche Weise wie beim Kaninchen Nr. 6 vorgenommen wurde, ergab ca. 250 bis 300 Stück.

4. 7. Temp. 39,6. Knötchen noch schärfer hervorgetreten. Sonstiger Befund wie gestern.

5. 7. Temp. 39,4. Impffläche nur noch leicht infiltriert und gerötet z. T. mit weißlichen Krusten bedeckt, Knötchen mit feinen Schüppchen überzogen.

6. 7. Temp. 39,3. Weitere Rückbildung.

7. 7. Temp. 39,1. Impffläche nur noch schwach gerötet und verkrustet. Knötchen kaum noch sichtbar.

8. 7. Temp. 38,9. Ohne Befund.

9. 7.-16. 7. Temp. 38,7-38,9.

17. 7. Temp. 38,9.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1 : 10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 39,1. Die intrakutanen Impfstellen kaum sichtbar infiltriert und schwach gerötet. Impffläche leicht infiltriert und stark gerötet.

19. 7. Temp. 39,6. Befund wie gestern.

20. 7. Temp. 39,1. Rückbildung der Reaktionen.

21. 7. Temp. 38,7. Die intrakutanen Impfstellen ohne Befund. Impffläche leicht gerötet und mit Schüppchen bedeckt.

22. 7. Temp. 38,8. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 8. Albino männlich.

30. 6. Temp. 38,9. Gewicht 1340 gr. Befinden gut.

1. Impfung. Kutan 1 ccm virulente Lymphe (1 : 1000)

1. 7. Temp. 38,9. Impffläche leicht infiltriert und stark gerötet.

2. 7. Temp. 38,8. Infiltration und Rötung verstärkt.

3. 7. Temp. 39,0. Impffläche nur noch schwach gerötet und infiltriert, bedeckt mit vielen hirsekorngroßen, stärker geröteten Fleckchen.

4. 7. Temp. 39,2. Impffläche wie gestern infiltriert und gerötet, bedeckt mit ca. 120 ziemlich genau zählbaren hirsekorngroßen Knötchen.

5. 7. Temp. 38,7. Ohne Veränderung.

6. 7. Temp. 39,0. Impffläche nur noch leicht infiltriert, Knötchen im Zurückbilden.

7. 7. Temp. 38,8. Impfstelle an Stelle der Knötchen mit leichten Krusten bedeckt.

8. 7. Temp. 38,9. Ohne Befund.

9. 7.-16. 7. Temp. 38,6-38,9.

17. 7. Temp. 38,9.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1 : 10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 38,8. Die intrakutanen Impfstellen im Durchmesser von 1,2-1,4 cm ganz schwach infiltriert und leicht gerötet. Impffläche kaum fühlbar infiltriert, aber stark gerötet.

19. 7. Temp. 39,5. Reaktionen verstärkt.

20. 7. Temp. 39,5. An der intrakutanen Impfstelle stark erhabene, derbe und intensiv gerötete Papeln von 1,5 cm Durchmesser. Impffläche stark infiltriert und gerötet, bedeckt mit vielen, z. T. konfluierenden Knötchen.

21. 7. Temp. 39,1. Papeln im Zurückbilden, mit

Schüppchen bedeckt. Impffläche mit feinen Krusten überzogen, sonst wie gestern.

22. 7. Temp. 38,9. Papeln kaum noch fühlbar, schwach gerötet. Impffläche leicht gerötet und verkrustet, Knötchen verschwunden.

23. 7. Temp. 38,8. Weitere Rückbildung.

24. 7. Temp. 38,9. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 9. Albinó weiblich.

30. 6. Temp. 39,0. Gewicht 1840 gr. Befinden gut.

1. Impfung Kutan 1 ccm virulente Lymphe 1 : 10000.

1. 7. Temp. 39,0. Impffläche stark gerötet, schwach infiltriert.

2. 7. Temp. 38,8. Impffläche schwach gerötet und infiltriert.

3. 7. Temp. 38,5. Rötung und Infiltration kaum noch sichtbar, einige kleine stärker gerötete Fleckchen.

4. 7. Temp. 38,8. Impffläche bedeckt mit 40 hirsekorngroßen stark geröteten Knötchen. Sonst ohne Befund.

5. 7. Temp. 38,7. Befund wie gestern.

6. 7. Temp. 38,7. Knötchen im Zurückbilden.

7. 7. Temp. 38,9. Knötchen leicht verkrustet. Sonst ohne Befund.

8. 7.-16. 7. Temp. 38,6-39,1.

17. 7. Temp. 38,9.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1 : 10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 39,0. Die intrakutanen Impfstellen sind leicht infiltriert und gerötet. Impffläche ebenfalls schwach infiltriert, aber stärker gerötet.

19. 7. Temp. 38,8. Stärkere Infiltrationen und Rötungen.

20. 7. Temp. 39,1. Stark erhabene und gerötete derbe Papeln von 1,5 cm Durchmesser. Impffläche stark infiltriert und gerötet, bedeckt mit vielen, hirsekorngroßen Knötchen.

21. 7. Temp. 38,8. Papein im Zurückbilden, mit Schüppchen bedeckt. Impffläche schwach infiltriert, gerötet, bedeckt mit weißlichen Krusten und vielen Knötchen.

22. 7. Temp. 38,9. Papeln kaum noch fühlbar und gerötet. Impffläche wie gestern. Knötchen im Zurückbilden.

23. 7. Temp. 38,9. Weitere Rückbildung.

24. 7. Ohne Befund.

Kaninchen Nr. 10. Albino weiblich.

30. 6. Temp. 38,8. Gewicht 1390 gr. Befinden gut.

1. Impfung. Kutan 1 ccm virulente Lymphe 1 : 100000

1. 7. Temp. 38,8. Impffläche stark gerötet.

2. 7. Temp. 38,4. Ohne Änderung.

3. 7. Temp. 38,8. Auf der Impffläche 4 rote hirsekorngroße Knötchen. Sonst ohne Befund.

4. 7. Temp. 38,9. Wie gestern.

5. 7. Temp. 39,0. Knötchen bilden sich zurück.

6. 7. Temp. 38,7. Ohne Befund.

7. 7.-16. 7. Temp. 38,7-39,0.

17. 7. Temp. 39,1.

Reinfektion. Intrakutan 0,5 ccm (1 : 10), kutan 0,25 ccm unverdünnt.

18. 7. Temp. 38,8. Die intrakutanen Impfstellen im Durchmesser von 2 cm schwach infiltriert und stark gerötet. Die Impffläche ebenfalls.

19. 7. Temp. 39,6. Befinden leicht getrübt. Befund wie gestern. An der Impffläche einige rote Knötchen.

20. 7. Temp. 38,6. Stark erhabene, derbe und intensiv gerötete Papeln von 1,2 cm Durchmesser. Impffläche stark infiltriert und gerötet, bedeckt mit vielen, z. T. konfluierenden Knötchen.

21. 7. Temp. 38,9. Papeln und Impffläche im Zurückbilden mit Schüppchen und Krusten bedeckt.

22. 7. Temp. 39,0. Papeln nur mehr erbsengroß, leicht erhaben und gerötet. Impffläche leicht infiltriert, gerötet, bedeckt mit Krusten. Knötchen im Zurückbilden.

23. 7. Temp. 38,8. Papeln kaum noch fühlbar, gerötet und mit Schüppchen überzogen. Impffläche verkruftet. Knötchen verschwunden.

Zusammenfassung des Versuches.

Aus unseren Versuchen ergibt sich in erster Linie eine weitgehende Übereinstimmung in der Art der durch die Reinfektion bedingten Veränderungen zwischen den beiden Methoden der kutanen und intrakutanen Impfung, mit welcher die Tiere vorbehandelt wurden. Kaninchen Nr. 1, das intrakutan vorbehandelt wurde, und zwar mit der gleichen Menge von 1 ccm einer 1:10 verdünnten Lymphe wie das kutan vorbehandelte Kaninchen Nr. 6, zeigt nach der am 17. Tage vorgenommenen kutanen und intrakutanen Reinfektion nur geringe Reaktionen ohne Temperatursteigerungen (fog. Frühreaktion). Bei diesem Tiere hatte die intrakutane Erstimpfung typische, am dritten Tage auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung angelangte Papelnbildung und eine Temperatursteigerung auf 40,2 hervorgerufen.

Das kutan vorbehandelte Kaninchen Nr. 6 hatte nach der Erstimpfung eine, ebenfalls mit Temperatursteigerung einhergehende stark ausgeprägte Infiltration der Impffläche mit Pustelbildung gezeigt, wobei die Zahl der entstandenen Vakzineknötchen auf 4-500 festgestellt wurde. Das Ergebnis der kutanen und intrakutanen Reinfektion bestand lediglich in geringgradiger Schwellung und Hyperämie, welche rasch wieder verschwanden. (Frühreaktion). Die beiden Tiere Nr. 1 und Nr. 6, welche also mit der immerhin beträchtlichen Menge von 1 ccm einer 10fach verdünnten Schutzpockenlymphe vorbehandelt waren und

welche als Folge dieser Infektion deutlich ausgeprägte Krankheitsercheinungen geboten hatten, waren dadurch gegen eine erneute Infektion vollständig immun` geworden. Das gleiche Bild, sowohl bei der Erstimpfung als auch bei der Reinfektion, finden wir bei den Kaninchen Nr. 2 und Nr. 7. Nach der Erstimpfung` zeigte Kaninchen 2 deutlich ausgeprägte Papelbildung` und Temperaturerhöhung, erstere jedoch in etwas geringerem Maße als Kaninchen 1 entsprechend der geringeren Menge des einverleibten infektiösen Materials. Die kutane Vorimpfung des Kaninchen 7 hatte ebenfalls ein deutlich positives Ergebnis wie Kaninchen 6, doch war die Zahl der entstandenen Vakzineknötchen nur 250-300, die Reinfektion ergab bei beiden Tieren (2 und 7) ein negatives Ergebnis. (Frühreaktion). Die Tiere waren also vollständig immun gegen Vakzine geworden. Bei den Tieren 3 und 8, welche intrakutan (3) und kutan (8) mit 1 ccm der 1:1000 verdünnten Schutzpockenlymphe vorbehandelt waren, änderte sich das Bild der durch die Reinfektion erzeugten Veränderungen. Kaninchen Nr. 3 hatte bei der Erstinfektion deutliche, doch in ihrer Intensität geringgradige Papeln mit abgekürztem Verlauf und ohne Temperatursteigerung bekommen. Tier Nr. 8 zeigte deutliche, wenn auch mäßige Temperaturerhöhung, leichte Infiltration und starke Rötung des Impffeldes, auf welchem sich 120 Vakzineknötchen durch Zählen feststellen ließen. Die Reinfektion führte bei Kaninchen Nr. 3 zu typischer, wenn auch im Verlauf abgekürzter Papelbildung an den intrakutanen Impfstellen und zu deutlichen Infiltrationen der kutanen Impffläche, unter starker Temperaturerhöhung auf 40,0 am 2. Tage. Die Reinfektion führte bei Kaninchen 8 ebenfalls zu Temperatursteigerung, Papelbildung und

starker Infiltration der Impffläche. Auffallend ist bei beiden Kaninchen der ziemlich rasche Ablauf der Erscheinung, welche nach etwa 1 Woche als abgeschlossen gelten kann. So haben wiederum beide Impfmethoden, wie bei den früheren Tieren zu gleichlaufenden Erscheinungen der Reinfektion, aber im Gegensatz zu diesem nicht zu völligen Immunität, sondern lediglich zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit geführt. Es erscheint merkwürdig, daß die deutlich ausgebildeten Papeln des Tieres Nr. 3 und die im allgemeinen gut ausgeprägten 120, also an Zahl durchaus nicht geringen Vakzineknötchen bei Tier Nr. 8 nicht genügten, um die beiden Organismen zu einer genügenden immunisatorischen Tätigkeit zu veranlassen. Danach konnte es nicht Wunder nehmen, daß auch die Kaninchen 4 und 9, die mit einer 1:10000 verdünnten Lymphe und noch weniger Kaninchen 5 und 10, welche mit einer 1:100000 verdünnten Lymphe vorbehandelt waren, eine Immunität gegenüber der Reinfektion nicht gewonnen hatten. Die Reinfektion ergab in allen Fällen stark ausgeprägte scharlachrot verfärbte Papeln an den intrakutanen Impfstellen und kräftig gerötete starke Infiltrationen der kutanen Impffläche mit einem Höhepunkt der Reaktion am 3. Tage, unter deutlicher Temperatursteigerung. Bei Kaninchen 4 und 9, den beiden mit 1:10000 verdünnten Lymphe vorbehandelten Tieren war die Rückbildung der zur vollständigen Entwicklung gelangten Reaktionsercheinungen etwas rascher als gewöhnlich, während bei Kaninchen 5 und 10 sich keinerlei Unterschiede gegenüber nicht vorgeimpften Tieren zeigten. Trotzdem also bei diesen Versuchen die intrakutane Vorimpfung zu zwar schwachen aber deutlichen Papeln und die kutane Erstimpfung noch zu 40 resp.

4 gut ausgebildeten Vakzineknötchen, also einwandfrei feststellbaren krankhaften Veränderungen geführt hat, war eine Immunität nicht eingetreten. Bestenfalls dürfte man Kaninchen 4 und 9 noch eine ganz schwach erhöhte Resistenz zusprechen.

Es geht aus diesen Versuchen hervor, daß zur Erreichung einer Immunität gegen Vakzine nicht jede Infektion mit virulenten Keimen genügt, sondern auch eine gewisse Grenzschwelle der Infektionsstärke überschritten werden muß. Daß die Menge der notwendigen Erreger sogar nicht unbeträchtliche Werte erreichen und die durch sie erzeugten krankhaften Veränderungen ziemlich ausgedehnter Natur sein müssen, um eine gegen eine erneute Infektion wirksame Immunität zu erzielen, ist insofern von gewissem praktischen Interesse, als dadurch Grundlagen für die Beurteilung des Wertes von Immunisierungsversuchen geliefert werden, welche mit sehr geringen Dosen vorgenommen wurden. Wenn es erlaubt ist, Ergebnisse von Tierversuchen auf die menschlichen Verhältnisse zu übertragen, so muß auch für die in der Humanmedizin gebräuchlichste Immunisierung, die gegen Pocken verlangt werden, daß eine nicht zu geringe Menge des Vakzineerregers dem Organismus einverleibt, daß also nicht unter eine bestimmte Zahl von Impfstellen herunter gegangen wird. Dabei ist natürlich zu beachten, daß die einverlebten Mengen von der Schutzpockenlymphe nicht diejenigen sind, welche zur Immunität führen, sondern daß den Erregern die Möglichkeit gegeben ist, sich zu vermehren. Erst die aus dieser Vermehrung hervorgegangenen Mengen der Keime bedingen die Immunität. Aus

diesem Grunde ist auch die Überlegung gerechtfertigt, ob die durch unsere ersten Versuche festgestellte Unmöglichkeit, Kaninchen mittelst abgetöteter Vakzine zu immunisieren, wirklich darauf zurückzuführen ist, daß an sich die vitale Funktion des Vakzineerregers unerläßliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Immunisierung ist, oder ob es sich hier nur um einfache Quantitätsfragen handelt. Wir haben zwar zu unserem ersten Versuch den Kaninchen mehrfach je 10 ccm einer 1:10 verdünnten abgetöteten Lymphe, also sehr hohe Dosen, die zu überschreiten aus praktischen Gründen gewisse Grenzen gezogen sind, injiziert, aber doch betragen diese Mengen nur das Mehrhundertfache der bei dem zweiten Versuch als notwendig erkannten Mindestmenge der virulenten Vakzine. Die Vermehrungsfähigkeit der Vakzineerreger in einem für sie hochempfindlichen Organismus, wie im Körper des Menschen und des Kaninchens ist sicherlich nicht mit einer Mehrhundertfachen Reproduktion erschöpft, sondern geht weit darüber hinaus. Das lassen sowohl unsere eigenen Versuche, welche mit relativ sehr geringen Mengen Vakzine vorgenommen wurden und welche ausgedehnte vakzinale Reaktionen hervorriefen, als auch die umfangreichen Versuche, welche zur Gewinnung der Schutzpockenlymphe ständig vorgenommen werden, deutlich erkennen. Wenn wir also die vitale Funktion des Vakzineerregers als unerläßliche Vorbedingung für erfolgreiche Immunisierung halten müssen, so könnte dieses auch lediglich darauf beruhen, daß die großen zur Immunisierung notwendigen Mengen eben erst durch die vitale Funktion der Vakzineerreger in dem zu immunisierenden Organismus selbst hergestellt werden müssen,

Literaturverzeichnis.

1. Dieudonné: Immunität, Schutzimpfung u. Serumtherapie 5. Aufl. 1908.
 2. Friedberger, E.: Zur Frage der Thyphus- und Choleraschutzimpfung. Zeitschrift für Immunitätsforschung Orig. Bd. 28. Nr. 315.
 3. Klimmer und Wolf-Eisner: Handbuch der Serumtherapie 1911.
 4. Kolle-Wassermann: Handbuch der path. Mikroorganismen.
 5. Kraus und Levaditi: Handbuch der Technik und Methodik der Immunitätsforschung.
-

An dieser Stelle sei es mir gestattet, Herrn Landesimpfarzt Privatdozent Dr. A. Groth für die Überweisung des Themas, sowie für die freundliche Unterstützung in der Arbeit, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.



An dieser Stelle sei es mir erlaubt, Herrn
Herrn Präsidenten zu danken, dass er die
Wahl der Theodor, sowie der Herrschaften,
Wahlung in der Folge, seinen Willen
ausgesprochen

